

**Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност
„Ревматология“ относно ваксиниране срещу COVID-19**

1. Пациентите с мускулно-скелетни и автоимунни възпалителни ревматични заболявания могат да бъдат ваксинирани с неживи ваксини, каквито са регистрираните до този момент ваксини срещу COVID-19.
2. Най-добре е ваксинацията да се извърши, когато заболяването е в ремисия или с ниска болестна активност. При животозастрашаващо заболяване ваксинацията срещу COVID-19 трябва да се осъществи възможно най-скоро.
3. Няма предпочитание към нито една от регистрираните до този момент ваксини срещу COVID-19. Следователно пациентите с автоимунни възпалителни ревматични заболявания трябва да получат ваксината, с която се разполага.
4. Препоръки за провеждане на имunosупресивното/имуномодулиращото лечение преди и след ваксинацията срещу COVID-19:
 - а) Лекарствени продукти, на които не се променя дозовия режим и ваксинацията може да се извърши във всеки един момент от приемането им: хидроксихлорохин; IVIG; глюкокортикоиди, преднизолонов еквивалент <math><20\text{mg}</math> / дневно; сулфасалазин; лефлуномид; микофенолат мофетил; азатиоприн; циклофосфамид (орално); TNFi; анти IL-6R; анти IL-1; анти IL-17; анти IL-12/23; анти IL-23; белимумаб; циклоспорин (орално).
 - б) Лекарствени продукти, на които се променя дозовия режим и ваксинацията се извършва в точно определен момент от приложението им:
 - метотрексат: пропуска се 1 седмица след всяка доза ваксина;
 - JAK инхибитори (тофацитиниб, барицитиниб, упадацитиниб): пропуска се 1 седмица след всяка доза ваксина;
 - abatacept, инжекционна форма: пропуска се една седмица преди и една седмица след първата доза ваксина;
 - abatacept, IV форма: ваксината се прилага 4 седмици след последната инфузия, след това се пропуска една седмица и се прилага следващата инфузия абатацепт;
 - ритуксимаб: COVID-19 ваксината се прилага приблизително 4 седмици преди следващата инфузия, следващата инфузия ритуксимаб се отлага с 2-4 седмици след втората доза ваксина - ако е възможно;

– инфузия с циклофосфамид: прилага се една седмица след всяка доза ваксина COVID-19.

5. След ваксинацията срещу COVID-19 пациентите с ревматични заболявания трябва да продължат да спазват всички насоки относно физическото дистанциране и други превантивни мерки.